

# আপনার সন্তান কি চাইল্ড কেয়ার অথবা স্কুলের জন্য প্রস্তুত? নিউ ইয়র্ক সিটির আবশ্যিক টিকা গ্রহণ বিষয়ে জানুন

2018-2019 স্কুলবছর

নিউ ইয়র্ক সিটির সকল 2 মাস থেকে 18 বছর বয়সী শিক্ষার্থীকে চাইল্ড কেয়ার অথবা স্কুলে যাবার জন্য নিচে উল্লিখিত টিকাগুলি নিতে হবে। এই স্কুল বছরে আপনার সন্তানের গ্রেড স্তরের **ভিত্তিতে তার** টিকার চাহিদাগুলি পর্যালোচনা করুন।

টিকাসমূহ	প্রি-কিনডারগার্টেন (চাইল্ড কেয়ার, হেড স্টার্ট, নার্সারি অথবা প্রি-কে)	কিনডারগার্টেন - 4 গ্রেড	5 গ্রেড	6 - 10 গ্রেড	11 - 12 গ্রেড
ডিপথেরিয়া, টিটেনাস এবং পারটুসিস (DTaP)	4 ডোজ	5 ডোজ অথবা 4 ডোজ শুধু যদি তৃতীয় ডোজ 4 বছরে অথবা তার অধিক বয়সে নেয়া হয়ে থাকে অথবা 3 ডোজ শুধু যদি শিক্ষার্থী 7 বছর অথবা তার অধিক বয়সের হয় এবং সিরিজটি 1 বছর অথবা তার অধিক বয়সে শুরু হয়ে থাকে		3 ডোজ	
টিটেনাস, ডিপথেরিয়া এবং পারটুসিস বুস্টার (Tdap)				1 ডোজ (11 বছর বয়সে অথবা তার পরে)	
পোলিও (আইপিডি/ওপিডি)	3 ডোজ	4 ডোজ অথবা 3 ডোজ শুধু যদি তৃতীয় ডোজ 4 বছরে অথবা তার অধিক বয়সে নেয়া হয়ে থাকে	3 ডোজ	4 ডোজ অথবা 3 ডোজ শুধু যদি তৃতীয় ডোজ 4 বছরে অথবা তার অধিক বয়সে নেয়া হয়ে থাকে	3 ডোজ
মিজলস, মামস্ ও রুবেলা (MMR)	1 ডোজ	2 ডোজ			
হেপাটাইটিস বি	3 ডোজ	3 ডোজ			
ভ্যারিচেলা (জলবসন্ত)	1 ডোজ	2 ডোজ	1 ডোজ	2 ডোজ	1 ডোজ
মেনিনজোককাল কনজুগেট (MenACWY)				7, 8, এবং 9 গ্রেড 1 ডোজ	12 গ্রেড: অথবা 2 ডোজ শুধু যদি তৃতীয় ডোজ 16 বছরে অথবা তার অধিক বয়সে নেয়া হয়ে থাকে
হেমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা টাইপ বি কনজুগেট (Hib)	1 থেকে 4 ডোজ শিক্ষার্থীর বয়স এবং আগে কত ডোজ নেয়া হয়েছে তার উপর নির্ভর করে				
নিউমোককাল কনজুগেট (PCV)	1 থেকে 4 ডোজ শিক্ষার্থীর বয়স এবং আগে কত ডোজ নেয়া হয়েছে তার উপর নির্ভর করে				
ইনফ্লুয়েনজা	1 ডোজ				

আপনার সন্তানের কত সংখ্যক টিকা আবশ্যিক হবে সেটি তার বয়স এবং এর আগে সে যেসব টিকা নিয়েছে তার নিরিখে ভিন্ন হতে পারে। আপনার সন্তানের বাড়তি টিকা অথবা টিকা ডোজের প্রয়োজন হতে পারে যদি তার বিশেষ কোন স্বাস্থ্যগত অবস্থা থাকে। কোন প্রশ্ন থাকলে আপনার ডাক্তারের সাথে কথা বলুন। আরও তথ্যের জন্য, 311 নম্বরে ফোন অথবা [nyc.gov/health](http://nyc.gov/health) সাইট দেখুন এবং সার্চ করুন **স্টুডেন্ট ভ্যাকসিন**