

انتباہ: اپنے بچے کے مدافعتی ٹیکوں کی صورت حال

تاریخ:	بچے کا نام:
اسکول ID:	اسکول / کلاس:
اسکول فون:	اسکول کا فون:

عزیزی والدین / سرپرست:

ہم نے آپ کے بچے کے مامونیت کے ریکارڈ کا ایک حالیہ جائزہ لیا ہے اور یہ جاننا ہے کہ آپ کے بچے کو اسکول میں حاضری کے لیے مطلوب ویکسین ٹیکہ (ٹیکے) کی ضرورت ہے۔ براہ کرم ذیل میں اس ریکارڈ کو فراہم کریں جو یہ ظاہر کرے کہ آپ کے بچے کو ذیل ویکسین ٹیکہ (ٹیکے) لگ چکے ہیں۔ اگر ہمیں، عوامی صحتیاتی قانون، حصہ 2164 § کے مطابق یہ ریکارڈ فراہم نہیں کیے جاتے ہیں تو آپ کے بچے کو ___/___/___ کے بعد اسکول میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ براہ کرم نوٹ کریں: اگر آپ کے بچے نے کم سے کم عمر سے قبل یا وقفوں میں ان ٹیکوں کی خوراک کو موصول کیا تھا تو ان کو درکار خوراکیوں کے لیے شمار نہیں کیا جا سکتا ہے۔

نوٹس (بلحاظ عمر اور گریڈ کے بارے میں تفصیلی کے لیے SH 65 سے رجوع کریں)	درکار خوراک (خوراکیوں کی تعداد)	ویکسین
<ul style="list-style-type: none"> پری کنڈر گارٹن (پری کے) کے لیے چار خوراکیں۔ کنڈر گارٹن (K). تا گریڈ 5 کے لیے 5 خوراکیں؛ اگر DTaP کی چوتھی خوراک 4 سال یا زائد عمر میں دی گئی تھی، پانچویں خوراک کی ضرورت نہیں ہے اور اگر سلسلہ 7 سال یا زیادہ عمر میں شروع کیا گیا تھا، صرف 3 خوراکیں درکار ہیں۔ گریڈز 6-12 کے لیے تین خوراکیں۔ 	1st 2nd 3rd 4th 5th	DTaP (Diphtheria-tetanus-acellular pertussis) DTP (Diphtheria-tetanus- pertussis) Td (Tetanus-diphtheria)
<ul style="list-style-type: none"> گریڈز 6 سے 12 میں 11 سال یا زائد عمر کے تمام بچوں کے لیے۔ 	1st	Tdap (Tetanus-diphtheria-acellular pertussis)
<ul style="list-style-type: none"> پری کنڈر گارٹن، گریڈز 11، 5 اور 12 کے لیے تین خوراکیں مطلوب ہیں۔ K تا گریڈ 4 اور گریڈز 6 تا 10 کے لیے چار خوراکیں درکار ہیں؛ اگر تیسری خوراک 4 سال یا زیادہ کی عمر میں لی گئی تھی، صرف 3 خوراکیں درکار ہیں۔ تمام گریڈز کے لیے، آخری خوراک 4 سال یا اس کے بعد اور پچھلی خوراک کے کم از کم 6 ماہ بعد درکار ہے۔ مامونیت کے ثبوت کے لیے بلڈ ٹیسٹ، تمام تینوں پولیو سیروٹائپس درکار ہیں۔ 	1st 2nd 3rd 4th	IPV/OPV (Polio)
<ul style="list-style-type: none"> صرف ڈے کیئر اور پری کنڈر گارٹن کے بچوں کے لیے: ویکسین معمول کے بچپن کے اور / یا بقایا شیڈول کے مطابق عمر کی مناسبت سے دی جانی چاہیے۔ 	1st 2nd 3rd 4th	Hib (Haemophilus influenzae type b)
<ul style="list-style-type: none"> پری کنڈر گارٹن کے لیے پہلی سالگرہ پر یا اس کے بعد ایک خوراک۔ گریڈز کنڈر گارٹن تا 12 کے لیے دو خوراکیں۔ دوسری خوراک ایک میزلز (ترجیحاً MMR) والی ویکسین پہلی خوراک کے کم از کم 28 یا زیادہ دنوں کے بعد دی جانی چاہیے۔ مامونیت کو ظاہر کرنے والا بلڈ ٹیسٹ کا ثبوت قابل قبول ہے۔ 	1st 2nd	MMR (Measles, mumps, rubella)
<ul style="list-style-type: none"> پری کنڈر گارٹن سے گریڈ 12 کے لیے تین خوراکیں مطلوب ہیں۔ مدافعت یا دامی انفیکشن سے بچاؤ کو ظاہر کرنے والے بلڈ ٹیسٹ کا ثبوت قابل قبول ہے 	1st 2nd 3rd	Hep B (Hepatitis B)
<ul style="list-style-type: none"> پری کنڈر گارٹن، گریڈز 11، 5 اور 12 کے لیے پہلی سالگرہ پر یا اس کے بعد ایک خوراک۔ کنڈر گارٹن تا گریڈ 4 اور گریڈز 6 تا 10 کے لیے دو خوراکیں کم از کم 28 دنوں کے وقفہ سے۔ مدافعت ظاہر کرنے والا بلڈ ٹیسٹ یا طبی خدمات فراہم کنندہ کی جانب سے بیماری سے بچاؤ کو ظاہر کرنے والے دستاویز قابل قبول ہے۔ 	1st 2nd	Varicella (Chickenpox)
<ul style="list-style-type: none"> صرف ڈے کیئر اور پری کنڈر گارٹن کے لیے: ویکسین معمول کے بچپن کے اور / یا بقایا شیڈول کے مطابق عمر کی مناسبت سے دی جانی چاہیے۔ 	1st 2nd 3rd 4th	PCV (Pneumococcal conjugate)
<ul style="list-style-type: none"> گریڈز 7، 8 اور 9 کے لیے ایک خوراک۔ گریڈ 12 کے لیے دو خوراکیں، بمعہ کم از کم ایک خوراک 16 سال کی یا زیادہ عمر میں موصول کی ہو۔ اگر پہلی خوراک 16 سال یا زیادہ عمر میں دی گئی تھی تو صرف 1 خوراک درکار ہے۔ 	1st 2nd 3rd	MenACWY (Meningococcal Conjugate)

اگر آپ کے بچے نے پہلے ہی یہ ٹیکے موصول کر لیے ہیں، اسکول نرس یا پرنسپل کو مستند ویکسین کا ریکارڈ پیش کریں۔ برائے مہربانی منسلک 2018-2019 مطلوبہ اسکول مدافعتی ٹیکوں کا شیڈول ملاحظہ کریں۔ اس بارے میں مزید جاننے کے لیے کہ آپ کا بچہ کہاں پر ٹیکے لگوا سکتا ہے 311 سے رابطہ کریں۔

(Principal Name/Singature)