

إشعار بالاستبعاد من المدرسة: بسبب عدم إكمال اللقاحات

اسم الطفل(ة):

التاريخ:

رقم الهوية المدرسية:

الصف/ الفصل:

المدرسة:

رقم هاتف المدرسة:

عزيزي الوالد(ة)/ولي(ة) الأمر:

الغرض من هذا الخطاب هو إبلاغكم بأن متطلبات التطعيم المدرسية لطفلكم غير كاملة. وبموجب الفقرة رقم 2164 من قانون الصحة العامة، لن يُسمح لطفلكم بالعودة إلى المدرسة إلا إذا قمتم بتزويدنا بالسجلات التي تثبت أنه تلقى اللقاح أو اللقاحات التالية:

ملاحظات (نرجو الرجوع للمستند SH65 للحصول على تفاصيل المتطلبات حسب السن والصف)	عدد الجرعات المطلوبة	اللقاح
<ul style="list-style-type: none"> أربع جرعات لصف ما قبل الروضة (Pre-K). خمس جرعات للصفوف من صف الروضة إلى الخامس؛ إذا كانت الجرعة الرابعة للقاح (DTaP) قد تم تلقيها في سن 4 سنوات أو أكثر، فلا داعي للجرعة الخامسة. وإذا كان عمر الطفل 7 سنوات أو أكثر وقد تم بدء إعطاء سلسلة اللقاحات في عمر 7 سنوات أو أكثر، فالمطلوب إعطاء 3 جرعات فقط. ثلاث جرعات لتلاميذ الصفوف من 6 إلى 12. 	الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة	<p>لقاح (DTaP) (الديفتيريا-التيتانوس-السعال الديكي غير الخلوي)</p> <p>لقاح (DTP) (الديفتيريا-التيتانوس-السعال الديكي)</p> <p>لقاح التيتانوس والديفتيريا (Td) (التيتانوس والديفتيريا)</p>
<ul style="list-style-type: none"> لجميع الأطفال في سن 11 سنة وأكثر في الصفوف من 6 إلى 12. 	الأولى	<p>لقاح (Tdap) (التيتانوس-الديفتيريا-السعال الديكي غير الخلوي)</p>
<ul style="list-style-type: none"> ثلاث جرعات لتلاميذ صفوف ما قبل الروضة، و5، و11، و12. مطلوب أربع جرعات لأطفال صف الروضة حتى الصف 3 وللصفوف من الصف 6 حتى الصف 10؛ إذا تم الحصول على الجرعة الثالثة في عمر 4 سنوات أو أكثر، فيلزم فقط أخذ 3 جرعات. لجميع الصفوف، يجب أن يتم إعطاء الجرعة الأخيرة في عمر 4 أو بعد وبعد 6 أشهر على الأقل من تاريخ الجرعة السابقة. مطلوب تقديم إثبات للمناعة عن طريق تحليل الدم، للأنواع الثلاث المعتادة من شلل الأطفال. 	الأولى الثانية الثالثة الرابعة	<p>لقاح (IPV/OPV) (شلل الأطفال)</p>
<ul style="list-style-type: none"> لأطفال دور الحضانة ومرحلة ما قبل الروضة فقط: يجب إعطاء اللقاح حسب ما يناسب السن وطبقاً للجدول الروتيني لتطعيمات الطفولة و/ أو الجرعات المنشطة. 	الأولى الثانية الثالثة الرابعة	<p>لقاح (Hib) (الأنفلونزا النزلية من النوع b)</p>
<ul style="list-style-type: none"> جرعة واحدة عند بلوغ السنة الأولى أو بعدها، لتلاميذ صف ما قبل الروضة. جرعتان لتلاميذ الصفوف من صف الروضة إلى 12. الجرعة الثانية من لقاح كيج الحصبة (يفضل أن يكون لقاح (MMR) يتعين تلقيها خلال فترة 28 يوماً أو أكثر بعد الجرعة الأولى. يتم قبول تحليل الدم الذي يثبت المناعة. 	الأولى الثانية	<p>لقاح (MMR) (الحصبة، والنكاف، والحصبة الألمانية)</p>
<ul style="list-style-type: none"> ثلاث جرعات لأطفال صف ما قبل الروضة حتى الصف 12. يتم قبول تحليل الدم الذي يثبت المناعة أو العدوى المزمنة. 	الأولى الثانية الثالثة	<p>لقاح (Hep B) (التهاب الكبد B)</p>
<ul style="list-style-type: none"> جرعة واحدة عند بلوغ سن سنة واحدة أو بعد ذلك لتلاميذ صفوف ما قبل الروضة، و5، و11، و12. جرعتان لأطفال صف الروضة حتى الصف 4، والصفوف من الصف 3 حتى 10 يفصل ما بين الجرعات مدة 28 يوماً على الأقل. يتم قبول تحليل الدم الذي يثبت المناعة أو تقديم مستند من مقدم الرعاية الصحية للمرض. 	الأولى الثانية	<p>الجديري المائي (Varicella) (الجديري المائي)</p>
<ul style="list-style-type: none"> لأطفال دور الحضانة ومرحلة ما قبل الروضة فقط: يجب إعطاء اللقاح حسب ما يناسب السن وطبقاً للجدول الروتيني لتطعيمات الطفولة و/ أو الجرعات المنشطة. 	الأولى الثانية الثالثة الرابعة	<p>لقاح (PCV) (المكورات الرئوية)</p>
<ul style="list-style-type: none"> جرعة لتلاميذ الصفوف 7، و8، و9. جرعتان للصف 12 على أن يكون قد تم إعطاء جرعة واحدة على الأقل في عمر 16 سنة أو أكثر. إذا لم يتم إعطاء الجرعة الأولى عند بلوغ الطفل سن 16 سنة أو أكثر، فيلزم حينها إعطاء جرعة واحدة فقط. 	الأولى الثانية الثالثة	<p>لقاح (MenACWY) (المكورات السحائية المتقارنة)</p>

إذا كنتم تعتقدون أن طفلكم قد تلقى هذه اللقاحات بالفعل، المرجو تقديم سجل التلقيح الأصلي إلى مدرسة أو مدير المدرسة. تجدون رفقاً هذه الرسالة نسخة من جدول التطعيمات المدرسية المطلوبة للعام الدراسي 2018-2019. لمعرفة المزيد حول مكان حصول طفلكم على اللقاحات، اتصلوا برقم هاتف الاستعلامات 311.

Principal Name/Signature(