

關於不能上學的通知：免疫注射未完成

學生姓名： _____ 日期： _____
 學生證號碼 (School ID)： _____ 年級/班級： _____
 學校： _____ 學校電話號碼： _____

尊敬的家長/監護人：

謹此通知，您的子女仍未完成上學必需的免疫注射。根據公眾健康法第 2164 條的規定，除非您提供您的子女已接種下列疫苗的記錄，否則他/她將不得返回學校上學：

疫苗	所需劑量	備註 (請參看 SH65 有關年齡和年級的詳細資訊)
DTaP (白喉-破傷風-非細胞性百日咳疫苗 /diphtheria-tetanus-acellular pertussis) DTP (白喉-破傷風-非細胞性百日咳疫苗 /diphtheria-tetanus-acellular pertussis) Td (破傷風-百日咳疫苗 /Tetanus-diphtheria)	第 1、2、3、4、5 劑	<ul style="list-style-type: none"> 學前班 (Pre-K) 需四劑。 幼稚園 (K) 至 5 年級需 5 劑；如果 DTaP 第 4 劑是在 4 歲或之後注射的，則不需要第 5 劑；並且如果兒童已是 7 歲或更大之後開始這一系列的，則只需要 3 劑。 6 年級至 12 年級需三劑。
Tdap (破傷風-白喉-非細胞性百日咳疫苗 /tetanus-diphtheria-acellular pertussis)	第 1 劑	<ul style="list-style-type: none"> 所有 11 歲或以上就讀 6 年級至 12 年級的學生。
注射式小兒麻痺疫苗/口服小兒麻痺疫苗 (IPV/OPV) (小兒麻痺症)	第 1、2、3、4 劑	<ul style="list-style-type: none"> 學前班、5 年級、11 年級和 12 年級需三劑。 幼稚園至 4 年級需以及 6 年級至 10 年級需四劑；如果第 3 劑是在 4 歲或之後注射的，則只需要 3 劑。 對所有年級而言，最後一劑需在 4 歲之際或之後並必須至少是在前一劑的 6 個月之後。顯示免疫力驗血證據，<u>所有這三種小兒麻痺症血清種類都是必要的。</u>
Hib (B 型嗜血桿菌疫苗 /Haemophilus influenzae type b)	第 1、2、3、4 劑	<ul style="list-style-type: none"> 僅適用於日托和學前班兒童：疫苗注射應按兒童期規程和/或後補計劃中根據年齡而進行。
MMR (麻疹、腮腺炎、德國麻疹 /Measles, mumps, rubella)	第 1、2 劑	<ul style="list-style-type: none"> 學前班要求 1 歲生日或之後一劑。幼稚園至 12 年級需二劑。 包含麻疹疫苗的第二劑 (最好是麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗) 應該在注射第一劑之後的 28 天或更晚注射。接受顯示免疫力證據的驗血報告。
Hep B (乙型肝炎疫苗/Hepatitis B)	第 1、2、3 劑	<ul style="list-style-type: none"> 學前班至 12 年級需三劑。接受顯示免疫力或慢性感染證據的驗血報告。
水痘疫苗 (Varicella) (雞痘)	第 1、2 劑	<ul style="list-style-type: none"> 學前班、5 年級、11 年級和 12 年級要求 1 歲生日或之後一劑 幼稚園至 4 年級和 6 年級至 10 年級的兩劑須至少相距 28 天。接受顯示免疫力證據的驗血報告或醫療提供者的疾病證明。
PCV (肺炎鏈球菌 /Pneumococcal conjugate)	第 1、2、3、4 劑	<ul style="list-style-type: none"> 僅適用於日托和學前班兒童：疫苗注射應按兒童期規程和/或後補計劃中根據年齡而進行。
MenACWY (腦膜炎鏈球菌 /Meningococcal Conjugate)	第 1、2、3 劑	<ul style="list-style-type: none"> 7、8 和 9 年級需一劑。 12 年級需兩劑，至少其中一劑須在年滿 16 歲時或之後。如果第 1 劑是在 16 歲或更大年齡時注射的，則只需一劑。

如果您的子女已經接種了這些疫苗，請將正式記錄交給學校護士或校長。請參見本信所附的一份「2018-2019 學年學校免疫要求時間表」如需了解您子女在何處可以獲得疫苗注射，請致電 311。

(Principal Name/Signature)

cc: Student file
Attendance Teacher